

El Parque Natural de Fuentes Carrionas Fuente Cobre-Montaña Palentina es un medio que posee una alta calidad paisajista y ambiental, a la par que ofrece unos rasgos ecológicos singulares.

Por ello, cuando visite nuestro Espacio Natural recuerde:

- Existen puntos de observación de la berrea recomendados por la Administración del Parque
- No transite por los caminos con su vehículo. Algunos caminos tienen acceso restringido
- Se recomienda acudir al servicio de empresas especializadas que cuenten con autorización del Parque para visitas guiadas.
- En caso de que practique senderismo recuerde que hay senderos señalizados. No se salga de los caminos.
- En el caso de que sea día de caza, colóquese en un lugar visible y con vestimenta apropiada.
- Para no alterar el comportamiento natural, y por su seguridad guarde distancia con los animales silvestres, no se acerque mucho a ellos.
- No espante los animales ni les altere, no se sabe como van a responder.

Para más información sobre visitas guiadas para la observación de la Berrea en nuestro Espacio Natural, consulte en la Casa del Parque:
Tfno: 979 870 688
e-mail: fuentes carrionas.ren@jcy l.es

La Casa del Parque dispone además de un servicio de alquiler de prismáticos y telescopios para la observación de fauna.

Todo un acontecimiento en la Montaña

La Berrea



parque natural
Fuentes Carrionas
y Fuente Cobre-
Montaña Palentina



patrimonio natural
de castiLa y León

CASA DEL PARQUE NATURAL DE FUENTES CARRIONAS Y FUENTE COBRE-MONTAÑA PALENTINA
C/ El Plantío s/n 34840 Cervera de Pisuerga (Palencia)
Tfno. 979 870 688 Correo: fuentes carrionas.ren@jcy l.es

El ciervo

Orden: **Artiodactyla**

Familia: **Cervidae**

Ciervo (*Cervus elaphus*), también denominado como *venado*, es el mayor de los rumiantes silvestres ibéricos.


Se le identifica por su **pelaje** color castaño con la parte ventral más clara y un escudo anal amarillento con los bordes más oscuros. Las crías presentan las partes superiores moteadas de manchas blancas: librea.

Tiene un fuerte dimorfismo sexual, los machos desarrollan **cuernas** que se caen y se regeneran anualmente. La nueva cuerna comienza a nacer en abril, con una cubierta de piel aterciopelada, conocida como borra o correal. En agosto la cornamenta ya está formada y la borra se va soltando, les produce un intenso picor y se restriegan contra los troncos y las ramas para arrancarla.

El **tamaño de la cuerna** depende de múltiples factores, la edad, la alimentación, la salud, etc..., desarrollándose cada año en mayor menor medida.



Huella de ciervo.



Cuerna de macho adulto.

La berrea

Con las primeras lluvias de septiembre se comienzan a escuchar los **berridos** de los machos, es un sonido profundo y largo, parecido a un mugido de vaca. Durante un mes los machos no dejarán de emitir fuertes berridos o bramidos. Con este gesto anunciará la llegada del celo y avisará de su presencia a las hembras y al resto de los machos.



Macho con su harén.

El macho intenta apoderarse de una parcela de terreno dentro del área de campeo de las hembras, si un intruso aparece en su territorio intentará disuadirlo, pero si este es un macho grande le plantará cara, berreará cerca de su contrincante y agachará la testuz dirigiendo las cuernas hacia él.

Tendrá lugar el **combate** entre ambos. Se golpearán con las cuernas tratando de desequilibrar al contrario. Cuando uno de ellos lo consiga, el vencido se retirará de inmediato o reiniciará la pugna.

A veces mueren de inanición, al quedar las cuernas tan enredadas que no son capaces de desengancharse.

La **defensa del territorio y el harén** suponen un gran esfuerzo, los machos no tienen tiempo para alimentarse, teniendo que retirarse a otras zonas a recuperar fuerzas. Este momento es aprovechado por los machos más jóvenes para cubrir a las hembras.

En los meses de mayo y junio tiene lugar el **nacimiento de las crías**, normalmente una cría por hembra.